

PROSPECTION MYCOLOGIQUE

VOGELGRUN

(ÎLE DE RHIN)

SAMEDI 11 AVRIL 2026

**SORTIE ORGANISÉE PAR LA SMHR
(SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN)**

Guide : Fabien SARRAILLON

Déterminateurs Fonge :

Bernard DISS - Daniel DOLL - Jean-Luc MULLER

Fabien SARRAILLON - etc

**Déterminateur des lichens : Daniel DOLL & Antoine BRESCIANI
(avec la collaboration de Marc KOLY pour 1 lichen)**

Photographies réalisées par Philippe DEFRANOUX

(Champignons classés alphabétiquement par noms scientifiques)







***Crepidotus cesatii* (Rabenh.) Sacc., 1877**
Crépidote à spores sphériques - Agaricales - Crepidotaceae



***Disciotis venosa* (Pers.) Arnould, 1893**
Pézize veinée - Pezizales - Morchellaceae



***Hypoxylon howeanum* Peck, 1872**
Synonyme : *Hypoxylon howeianum* Peck, 1872
Xylariales - Xylariaceae

sur :

Ulmus minor Mill., 1768
Orme mineur - Petit orme - Orme cilié - Orme champêtre - Ormeau
Rosales - Ulmaceae



***Hypoxylon howeanum* Peck, 1872**

Synonyme : *Hypoxylon howeianum* Peck, 1872

Xylariales - Xylariaceae

sur :

Ulmus minor Mill., 1768

Orme mineur - Petit orme - Orme cilié - Orme champêtre - Ormeau


Rosales - Ulmaceae



***Morchella esculenta* (L.) Pers., 1794**
Morille ronde - Morille grise - Pezizales - Morchellaceae



***Morchella esculenta* (L.) Pers., 1794**
Morille ronde - Morille grise - Pezizales - Morchellaceae



***Mycena galericulata* (Scop.) Gray, 1821**
Mycène casquée - Mycène en casque - Tricholomatales - Mycenaceae



***Neolentinus degener* (Kalchbrenner) P. Hrouda, 2001 (INPN)**

Synonymes :

***Neolentinus schaefferi* (Redhead & Ginns) Rauschert, 1988**

***Neolentinus cyathiformis* (Schaeff.) Della Magg. & Trassin., 2014**

(Synonyme non indiqué dans l'INPN)

Lentin de Schaeffer - Gloeophyllales - Gloeophyllaceae

Espèce dédiée au naturaliste allemand

Jacob (Jakob) Christian SCHÄFFER (1718-1790)

(botaniste - mycologue - entomologiste - ornithologue)



***Neolentinus degener* (Kalchbrenner) P. Hrouda, 2001 (INPN)**

Synonymes :

***Neolentinus schaefferi* (Redhead & Ginns) Rauschert, 1988**

***Neolentinus cyathiformis* (Schaeff.) Della Magg. & Trassin., 2014**

(2^{ème} synonyme non indiqué dans l'INPN)

Lentin de Schaeffer - Gloeophyllales - Gloeophyllaceae



***Polyporus picipes* Fr., 1838**

Synonymes :

***Polyporus badius* (Pers.) Schwein., 1832**

***Polyporus durus* (Timm) Kreisel, 1984**

***Picipes badius* (Pers.) Zmitr. & Kovalenko, 2016**

Polypore bai - Polyporales - Polyporaceae



***Pluteus romellii* (Britzelm.) Sacc., 1895**
Plutée de Romell - Pluteales - Pluteaceae

Espèce dédiée au mycologue suédois Lars ROMELL (1854-1927)



***Steccherinum robustius* (J. Erikss. & S. Lundell) John Eriksson, 1958**
Polyporales - Steccherinaceae



Scutellinia sp. - Pézize - Pezizales - Pyronemataceae



***Xanthophyllomyces dendrorhous* Golubev (Inventaire général)
Vomi de cerf - Cystofilobasidiales - Cystofilobasidiaceae**

Nota : Téléomorphe de *Phaffia rhodozyma*, = *Rhodozyma montanae*), incluant *Cryptococcus macerans* et *Cryptococcus* sp. Proche de *Cystofilobasidium macerans*. Signalé en Suisse sous *Fusicolla merismoides*, en Angleterre sous vomit de cerf et en France sous *Pionnotes cesatii*.

MICROMYCÈTES



***Entyloma ficariae* A.A. Fisch. Waldh., 1877**
Entylomatales - Entylomataceae

sur Ficaire



***Uromyces pisi* (groupe) - Pucciniales - Pucciniaceae**

Rouille du pois

sur :

Euphorbia cyparissia L., 1753

Euphorbe Petit-Cyprès - Euphorbe faux cyprès

Malpighiales - Euphorbiaceae

MYXOMYCÈTE



Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel., 1791
Tubifère rouillé - Tubifère ferrugineux - Liceales - Reticulariaceae

LICHENS



***Cladonia rangiformis* Hoffm., 1796 - Lecanorales - Cladoniaceae**

(Dét. Daniel Doll & Marc Joly)



Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., 1860
Lichen encroûtant jaune - Parmélie des murailles
Teloschistales - Teloschistaceae

OBSERVATIONS ENTOMOLOGIQUES



Carabus auratus Linnaeus, 1761

Carabe doré - Sergent - Vinaigrier - Jardinière - Coleoptera - Carabidae



***Pyrochroa coccinea* (Linnaeus, 1761)**

Pyrochroa rouge - Pyrochre écarlate - Cardinal à tête noire

Coleoptera - Pyrochroidae



Tropinota hirta (Poda, 1761)
Cétoine hérissée - Cétoine velue - Coleoptera - Scarabaeidae



Tritoma bipustulata Fabricius, 1775 - Coleoptera - Erotylidae



Vraisemblablement une chenille de :

***Orthosia cruda* (Denis & Schiffermüller, 1775)
Orthosie farineuse - Lepidoptera - Noctuidae**



Nid de fourmis

***Lasius fuliginosus* (Latreille, 1798)**

Fourmi fuligineuse - Hymenoptera - Formicidae



Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)

Fourmi fuligineuse - Fourmi noire des bois - Hymenoptera - Formicidae

Nota :

Lasius fuliginosus émet une odeur de citronnelle lorsqu'elle est dérangée.

Elle vit dans les arbres creux.