

PROSPECTION MYCOLOGIQUE

EFFECTUÉE LE 07.10.2026
A L'ÉCOMUSÉE D'ALSACE

PAR DANIEL DOLL

6 NOUVEAUX TAXONS POUR L'INVENTAIRE DE LA FONGE

Alnicola bohémica (Velen.) Kühner et Maire, 1937
Alnicole de Bohême - Agaricales - Hymenogasteraceae

Alnicola umbrina (Maire) Kühner, 1931
Naucorie commune - Agaricales - Hymenogasteraceae

Hemimycena crispula (Quél.) Singer, 1943 - Tricholomatales - Mycenaceae

Hydnellum lepidum (Maas Geest.) E. Larss., K.H. Larss. & Kõljalg, 2019
Ancien nom avant révision récente :
Sarcodon lepidus Maas Geest., 1975 (INPN)
Thelephorales - Bankeraceae

Nouveauté alsacienne

MICROMYCÈTES « OÏDIUMS »

Erysiphe circaeae L. Junell, 1967 - Erysiphales - Erysiphaceae

Erysiphe penicillata (Wallr.) Link, 1824 - Erysiphales - Erysiphaceae
Nouveauté alsacienne

NOTA :

LE DERNIER INVENTAIRE DE LA FONGE COMPRENAIT 1269 TAXONS
LE TOTAL ACTUEL EST DE 1275 TAXONS

Photos réalisées par Daniel DOLL
« sauf mentions contraires : Lionel JUIF »)

(Espèces classées alphabétiquement par noms scientifiques)



Alnicola bohémica (Velen.) Küner et Maire, 1937
Alnicole de Bohême - Agaricales - Hymenogasteraceae

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Écomusée

Complexe d'espèces avec caractères croisés.

(Lieu : Forêt située à l'arrière du Grand marais à droite du sentier entre la fosse aux tritons
et le vieux tas de bois - zone vers H-6/H-5)



Alnicola umbrina (Maire) Kühner, 1931

Naucorie commune - Agaricales - Hymenogasteraceae

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Écomusée

(Lieu : Forêt située à l'arrière du Grand marais à droite du sentier entre la fosse aux tritons
et le vieux tas de bois - zone vers H-6/H-5)



***Caloboletus radicans* (Pers.) Vizzini, 2014 (INPN)**

Synonyme : *Boletus radicans* Pers., 1801

Boletus radicans - Boletales - Boletaceae

sous Tremble

(Lieu : sentier après le carrefour des libellules - zone vers F-7/G-7)



***Cortinarius lacustris* Moëgne-Locc. & Reumaux, 1997**
Agaricales - Cortinariaceae

(Lieu : Forêt située à l'arrière du Grand marais à droite du sentier entre la fosse aux tritons et le vieux tas de bois - zone vers H-6/H-5)

Nota :

Espèce rarement déterminée, la seule référence 68 remonte à Paul Hertzog il y a 25 ans, dans un fossé humide de la Gauchmatt (Soultzmatt).

Signalée plus récemment dans le 67 par Jean-Michel Trendel à Haguenau et à Ingwiller.



***Cortinarius lacustris* Moëgne-Locc. & Reumaux, 1997**
Agaricales - Cortinariaceae

(Lieu : Forêt située à l'arrière du Grand marais à droite du sentier entre la fosse aux tritons
et le vieux tas de bois - zone vers H-6/H-5)



***Cortinarius subertipes* Romag., 1952 - Agaricales - Cortinariaceae**

Assimilé par certains mycologues à *C. casimiri*.

(Lieu : Forêt zone vers H-6 « avant d'arriver au vieux tas de bois »)



***Diatrype bullata* (Hoffm.) Fr., 1849**
Diatrype en bulle - Xylariales - Diatrypaceae

(Lieu : sortie forêt « vers Maison du 21^{ème} siècle » en venant du vieux tas de bois - zone H1)



***Ganoderma australe* (Fr.) Pat., 1889**
Synonyme : *Ganoderma adpersum* (Schulzer) Donk, 1969
Ganoderme épaisi - Polyporales - Ganodermataceae

(Obs. Lionel Juif - Dét. Daniel Doll)

(Lieu : Forêt zone I1/I-1 « à proximité de la Tanière »)



Hemimycena crispula (Quél.) Singer, 1943 - Tricholomatales - Mycenaceae

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Écomusée

**2ème station après Markus Wilhelm PCA et troisième alsacienne après Olivier Rose
à Lauterbourg**

(Lieu : Forêt située à l'arrière du Grand marais à droite du sentier entre la fosse aux tritons
et le vieux tas de bois - zone vers H-6/H-5)



***Hydnellum lepidum* (Maas Geest.) E. Larss., K.H. Larss. & Kõljalg, 2019**

Ancien nom avant révision récente :

***Sarcodon lepidus* Maas Geest., 1975 (INPN)**

Thelephorales - Bankeraceae

Nouveauté alsacienne

(Lieu : Russawag « aux alentours de l'observatoire » - zone vers D-5)



***Hydnellum lepidum* (Maas Geest.) E. Larss., K.H. Larss. & Kõljalg, 2019**

Ancien nom avant révision récente :

***Sarcodon lepidus* Maas Geest., 1975 (INPN)**

Thelephorales - Bankeraceae

(Lieu : Russawag « aux alentours de l'observatoire » - zone vers D-5)



***Hydnellum lepidum* (Maas Geest.) E. Larss., K.H. Larss. & Kõljalg, 2019**

Ancien nom avant révision récente :

***Sarcodon lepidus* Maas Geest., 1975 (INPN)**

Thelephorales - Bankeraceae

(Lieu : Russawag « aux alentours de l'observatoire » - zone vers D-5)

(Photo Lionel JUIF - Dimanche 04.10.2026)

(Champignon déterminé le 07.10.2026 par Daniel DOLL)



***Lactarius lacunarum* Romagn. ex Hora, 1960**
Lactaire des boursiers - Russulales - Russulaceae

(Lieu : Forêt située à l'arrière du Grand marais à droite du sentier entre la fosse aux tritons
et le vieux tas de bois - zone vers H-6/H-5)



***Leccinum duriusculum* (Schulzer ex Kalchbr.) Singer, 1947**
Bolet rude des trembles - Boletales - Boletaceae

sous Tremble

(Lieu : sentier après le carrefour des libellules - zone vers F-7/G-7)



Marasmius bulliardii Quél., 1878
Marasme de Bulliard - Tricholomatales - Marasmiaceae

Nota : greffé sur feuille, le tronc n'est qu'un support pour la photo.

(Lieu : Forêt située à l'arrière du Grand marais à droite du sentier entre la fosse aux tritons
et le vieux tas de bois - zone vers H-6/H-5)



***Russula fragilis* Fr., 1838 - Russule fragile - Russulales - Russulaceae**

(Lieu : Forêt située à l'arrière du Grand marais à droite du sentier entre la fosse aux tritons et le vieux tas de bois - zone vers H-6/H-5)



***Russula vesca* f. *avellanea* Melzer & Zvara - Russulales - Russulaceae**

(Lieu : Forêt située à l'arrière du Grand marais à droite du sentier entre la fosse aux tritons
et le vieux tas de bois - zone vers H-6/H-5)

MICROMYCÈTES « OÏDIUMS »



***Erysiphe penicillata* (Wallr.) Link, 1824 - Erysiphales - Erysiphaceae**



Nouveauté alsacienne

sur un arbrisseau :

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790

Aulne glutineux - Verne - Vergne - Fagales - Betulaceae

(Lieu : après le carrefour des libellules, à gauche, zone vers F-7/G-7)



Vues au microscope de :

Erysiphe penicillata (Wallr.) Link, 1824 - Erysiphales - Erysiphaceae

"Cléistothèces de taille moyenne (85-110 μm de diamètre) avec fulcres multi-divisés à l'extrémité (pas visible sur la photo), assez rigides, un peu plus longs que le cléistothèce, et asques à spores nombreuses (6 repérées)". (eau, 200x)

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Écomusée

Pas de photo réalisée sur le terrain

***Erysiphe circaeae* L. Junell, 1967 - Erysiphales - Erysiphaceae**

sur :

Circaea lutetiana L., 1753

Circée de Paris - Circée commune - Herbe des sorcières

Myrtales - Onagraceae

(Lieu : sortie forêt « vers Maison du 21^{ème} siècle » en venant du vieux tas de bois - zone H1)



***Erysiphe circaeae* L. Junell, 1967 sur *Circaea lutetiana* L., 1753**

Nota : La plante présentée a été photographiée hors de l'Écomusée.

Photo insérée dans l'album afin d'avoir un aperçu de l'aspect de l'espèce.

(Lieu : TRAUBACH-LE-BAS - 15.08.2023 - Observateur et déterminateur : Daniel DOLL)

ADDITIF
CHAMPIGNONS OBSERVÉS ET PHOTOGRAPHIÉS
PAR LIONEL JUIF LE DIMANCHE 01.10.2026
(ESPÈCES DÉTERMINÉES LE 07.10.2026 PAR DANIEL DOLL)



***Aleuria aurantia* (Pers.) Fuckel, 1870**
Pézize orangée - Pezizales - Pyronemataceae

(Lieu : à proximité de la Maison du 20^{ème} siècle « Maison des naturalistes » - zone vers H1)



***Gymnopilus junonius* (Fr.) P. D. Orton, 1960 (INPN)**
Synonyme : *Gymnopilus spectabilis* (Weinm.) A. H. Sm., 1949
Pholiote remarquable - Agaricales - Cortinariaceae

(Lieu : Russawag « aux alentours de l'observatoire » - zone vers D-5)